


Sencillos pasos para la autoinyección de Ovidrel®



Solo con fines ilustrativos.

La confianza importa

Desde 2001, Ovidrel® ha sido una inyección desencadenante utilizada por más de 3.5 millones de pacientes que buscan la paternidad.

INDICACIONES

¿Cuáles son los usos de la jeringa precargada de Ovidrel® (inyección de coriogonadotropina alfa)?

Ovidrel® Jeringa precargada (inyección de coriogonadotropina alfa) está indicada para la maduración final del óvulo, como preparación para la su extracción. Las mujeres que reciben Ovidrel® se han sometido a una desensibilización hipofisaria y han recibido un pretratamiento adecuado con hormona foliculoestimulante (FSH) como parte de un programa de Tecnología de Reproducción Asistida (TRA), como la Fertilización in vitro (FIV) o la transferencia de embriones.

Ovidrel® Jeringa precargada también está indicada para la inducción ovulatoria (OI) y el embarazo en pacientes infértiles que no ovulan y en las que la causa de la infertilidad es funcional y no se debe a una insuficiencia ovárica primaria.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS

¿Quién no debería usar Ovidrel® Jeringa precargada?

Ovidrel® Jeringa precargada no debe usarse en pacientes:

- con alergias a la hormona hCG o cualquier otro ingrediente del medicamento
- con insuficiencia ovárica primaria (los ovarios ya no producen óvulos)
- con una enfermedad de tiroides o suprarrenal no controlada
- con cáncer de cerebro, como tumor pituitario
- con antecedentes de sangrado anormal del útero o de la vagina
- con ovarios inflamados, agrandados o que producen dolor
- con cáncer de los órganos sexuales
- que están embarazadas

Cómo usar Ovidrel®

Ovidrel® debe inyectarse en la parte inferior del abdomen, al menos a una pulgada del ombligo. Aplique siempre la inyección exactamente según las indicaciones de su médico.

Lea con atención las siguientes instrucciones.

PREPARACIÓN: Antes de comenzar



Saque el medicamento del refrigerador aproximadamente 30 minutos antes de usarlo.



Reúna todo lo que necesita sobre una superficie limpia y plana:

- una jeringa precargada de Ovidrel®
- dos hisopos con alcohol
- un recipiente para objetos punzantes



Lávese las manos con agua y jabón, luego limpie la piel en el lugar de la inyección con un paño embebido en alcohol

Ovidrel® Jeringa precargada está desarrollada para aplicar una sola inyección subcutánea. Cualquier material no utilizado debe desecharse.

Antes de comenzar con Ovidrel®, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas. Informe a su prestador de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Se recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088 o comuníquese con EMD Serono al 1-800-283-8088.

Consulte la Información importante sobre riesgos que continúa en la página 2 y la Información de prescripción completa adjunta.

Paso 1:

Preparar la jeringa y el lugar de la inyección



Retire con cuidado la tapa de la jeringa.

No toque la aguja ni permita que esta toque ninguna superficie.



Con la aguja apuntando hacia arriba, golpee suavemente la jeringa hasta que todas las burbujas suban hasta la parte superior.



Presione lentamente el émbolo hasta que aparezca una pequeña gota de líquido en la punta de la aguja.



Elija un lugar de inyección en el abdomen. Con el hisopo con alcohol, limpie la piel en el lugar elegido.

Paso 2:

Injectar el medicamento



Con una mano, pellizque la piel alrededor del lugar de inyección que limpió previamente.



Inserte toda la longitud de la aguja en la piel en un ángulo ascendente de 45 ° a 90 °; luego suelte la piel pellizcada.



Presione lentamente el émbolo hasta que se inyecte todo el medicamento.



Retire la aguja y deseche la jeringa en un recipiente para objetos punzantes.

Consulte las preguntas frecuentes para la eliminación segura de agujas, jeringas y viales usados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo desecho correctamente la jeringa de Ovidrel®?

Todas las jeringas deben ser eliminadas en un recipiente para eliminar objetos punzantes aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) inmediatamente después de su uso.

Si no tiene un recipiente para objetos punzantes, **no tire agujas ni viales sueltos en el basurero de su casa**. En su lugar, use un contenedor que:

- esté hecho de plástico resistente
- se pueda cerrar con una tapa hermética que sea resistente a los pinchazos
- se encuentre en posición vertical y estable durante el uso
- sea resistente a las filtraciones
- esté debidamente etiquetado para advertir que hay residuos peligrosos dentro del contenedor inside the container

Para obtener más información, visite www.fda.gov/safesharpsdisposal.

¿Puedo usar mi medicamento si lo dejé afuera, en un automóvil, y hacia frío o calor?

Ovidrel® debe ser conservado en un lugar protegido de la luz. Guarde su jeringa precargada en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F. La jeringa puede ser usada hasta la fecha de vencimiento que se muestra en la caja. Si se mantiene a temperatura ambiente (hasta 77 °F), la Jeringa precargada de Ovidrel® debe desecharse después de 30 días.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer antes de comenzar con Ovidrel®?

- En pacientes tratadas con FSH y hCG, puede producirse un agrandamiento de los ovarios no complicado, de leve a moderado, que puede estar acompañado de distensión y/o dolor abdominal.
- El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) puede progresar rápidamente desde un agrandamiento ovárico sin complicaciones y convertirse en un evento médico grave. Los primeros signos del SHO incluyen dolor pélvico intenso, náuseas, vómitos y aumento de peso. Llame a su médico de inmediato si cree que podría tener síntomas de SHO.
- El tratamiento con Ovidrel® puede resultar en que quede embarazada de más de un bebé.
- Del tratamiento con Ovidrel® pueden resultar coágulos de sangre.
- No se sabe si este medicamento está presente en la leche materna. Debido a que muchos medicamentos se excretan en la leche materna, informe a su médico si está amamantando.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Ovidrel® Jeringa precargada?

Los efectos secundarios más comunes en las mujeres que usan Ovidrel® Jeringa precargada incluyen dolor abdominal, náuseas y vómitos. Las inyecciones con aguja pueden causar algunas molestias.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Ovidrel®. Para obtener más información, lea la etiqueta del producto y consulte con su prestador de atención médica o farmacéutico.

Llame a su prestador de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información de prescripción completa y la educación para el paciente de Ovidrel® que se proporciona con estas notas y en la caja de su producto, o visite EMDSeronoFertility.com



MÁS APOYO

Escanee el código QR para ver un video de la inyección de Ovidrel® (coriogonadotropina alfa para inyección).

Para obtener más materiales de apoyo, visite EMDSeronoFertility.com.